



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:


- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

640
B21
25

JP







LES
ARBRES, ARBRISSEAUX
& ARBUSTES A FLEURS

DE PLEIN AIR

LEUR MODE DE FLORAISON

TAILLE D'HIVER — TAILLE D'ÉTÉ — ABSENCE DE TAILLE

PAR

CHARLES BALTET

Horticulteur à Troyes

CINQUIÈME ÉDITION

CHEZ L'AUTEUR, A TROYES
Faubourg Croncels, 26

LIBRAIRIE AGRICOLE
Rue Jacob, 26, Paris

LIBRAIRIE MASSON ET C^e
Boulevard Saint-Germain, 120, Paris

LIBRAIRIE HORTICOLE
Rue de Grenelle, 84 bis, Paris

1905

LES
ARBRES, ARBRISSEAUX
& ARBUSTES A FLEURS

DE PLEIN AIR

LEUR MODE DE FLORAISON

TAILLE D'HIVER — TAILLE D'ÉTÉ — ABSENCE DE TAILLE

PAR

CHARLES BALTET

Horticulteur à Troyes

CINQUIÈME ÉDITION

CHEZ L'AUTEUR, A TROYES
Faubourg Croncels, 26

LIBRAIRIE AGRICOLE
Rue Jacob, 36, Paris

LIBRAIRIE MASSON ET C^e
Boulevard Saint-Germain, 120, Paris

LIBRAIRIE HORTICOLE
Rue de Grenelle, 34 bis, Paris

1905

Jan. 1913
29032

Q40

B21

a

DROITS DE REPRODUCTION ET DE TRADUCTION RÉSERVÉS

LES
ARBRES, ARBRISSEAUX
& ARBUSTES A FLEURS
DE PLEIN AIR

LEUR MODE DE FLORAISON

TAILLE D'HIVER — TAILLE D'ÉTÉ — ABSENCE DE TAILLE

PAR

CHARLES BALTET

La Société Nationale d'Horticulture de France, voulant faire apprécier l'importance et la valeur des arbres et des arbustes d'ornement au point de vue de la décoration florale des parcs et des jardins de plaisance, en proposa l'étude au Congrès de 1898, limitant le champ aux opérations dites « de taille » qui, basées sur l'époque et le mode de floraison, en assureraient le renouvellement, sans amoindrir la vigueur ni la durée de la plante.

Nous y répondons.

En général, dans un climat tempéré, le principe de la taille des arbustes pourrait être formulé ainsi :

1° Tailler au repos de la sève les espèces qui fleurissent pendant le cours de la végétation, sur les jeunes rameaux herbacés ; c'est la *taille d'hiver* ou *taille en sec*.

2° Tailler en pleine végétation, aussitôt la période de floraison terminée, les espèces qui ouvrent leur corolle ou leur inflorescence au début de la sève, de janvier en juin, sur des rameaux de l'année précédente ou plus âgés ; c'est la *taille d'été* ou *taille en vert*.

Dans les deux cas, il convient d'agir de telle façon que les éléments floraux arrivent, bien constitués, à l'époque de leur épanouissement.

Le pincement, ou écimage d'été, fortifie ou fait ramifier les longs rameaux qui doivent fleurir en hiver ou au printemps suivant, et en augmente ainsi la parure florale.

D'après nos instructions, la taille est *longue*, lorsqu'on laisse plus de bois à la plante ; *courte*, quand on lui en retranche davantage ; *combinée*, si les deux opérations sont appliquées à la fois sur le même arbuste, système préférable à l'alternance de la taille.

En dehors des règles à suivre, la taille longue ou l'absence de taille auraient plus de succès que les mutilations exagérées, fréquemment renouvelées.

Partout et toujours, nous recommandons la toilette des arbres, arbrisseaux et arbustes par l'éclaircissage de leur ramure trop touffue, leur rajeunissement par la suppression des vieilles tiges fatiguées, stériles, remplacées par des rejets vigoureux, enfin les soins de propreté, le nettoyage des écorces écailleuses ou moussues, la suppression du bois mort, des chicots, des « têtes de Saule » et des débris d'inflorescences finies.

ÉTUDE DES PRINCIPAUX GENRES DE L'ARBUSTERIE FLORALE

Examinons brièvement les principaux genres de végétaux ligneux, fleurissants et décoratifs pour nos plantations d'agrément, avec une indication du traitement à leur appliquer. Cependant les espèces, peu intéressantes par leur fleuraison, seront signalées si elles possèdent d'autres qualités ornementales, apicoles ou cynégétiques.

D'abord les petits arbres, les grands arbrisseaux et les arbustes nains ; ensuite les arbres à grande arborescence.

I. — PETITS ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES A FLEURS

Abélia, *Abelia* (Caprifoliacées) (1). — Arbuste délicat, se couvrant, en première saison et fin été, de bouquets de fleurs tubulées blanc rosé, à odeur fine.

Tailler les rameaux fluets au printemps, conserver les autres.

(1) Le nom de la Famille est d'après les formules récentes de la Botanique. C'est le dernier cri !...

Actinidia, Actinidia (Dilléniacées). — Arbuste demi-sarmenteux ; fleur axillaire, blanc pur ou crémeux, en juin.

Tailler modérément, fin hiver.

Ajonc, Ulex (Légumineuses Génistées). — Arbuste vert, épineux, qui croît dans les landes et les friches granitiques ou siliceuses et les embellit par sa floraison automnale, jaune vif. Sa variété à fleur double intéresse les jardins, comme le type *inermis* (?) les parcs ruraux.

Au printemps, écimage des rameaux irréguliers.

Akébia, Akebia (Berbéridacées Lardizabalées). — Arbuste sous-ligneux, volubile, à feuilles persistantes, fleurissant au réveil de la sève. La fleur est violet prune ou rose vineux, d'un parfum particulier.

Éviter la taille d'hiver. Toilette et palissage des rameaux en été.

Alaterne et Bourgène, Rhamnus (Rhamnacées). — Arbrisseaux verts pour la garniture des murailles et des sous-bois. Fleur nulle. Palissage et taille longue en été.

La jolie Bourgène du Liban est à feuilles caduques.

Albizzia, Albizzia (Légumineuses Ingées). — Arbrisseau élégant par son feuillage léger, ses fleurs vaporeuses. C'est « l'arbre de soie » des climats tempérés.

Terre légère, situation chaude, lumineuse.

Tailler à mi-bois, après l'hiver, et mastiquer la plaie.

Althéa, Hibiscus « Ketmie des jardins » (Malvacées). — Arbuste ou petit arbrisseau touffu, fleurissant sur les jeunes pousses, fin été ; nombreuses variétés au coloris blanc, rose, rouge, lilas, mauve, ardoisé ; corolle axillaire, large, bien ouverte, simple ou double.

Tailler au printemps, lors du gonflement des yeux ; tailler court, sauf dans les situations ombragées.

Amandier, Amygdalus (Rosacées Prunées). — Arbrisseau buissonneux, développant en première saison ses fleurs blanches, roses ou rouges, simples ou doubles, sur les jeunes rameaux.

Tailler à mi-bois, aussitôt la défloraison.

Amélanchier et Aronia (Rosacées Pomées). — Deux genres voisins d'arbustes à fleur printanière, par corymbes et épis blanc de neige ; fruit rouge ou noir.

Absence de taille d'hiver ; en été, éliminer les longs rameaux.

Amorpha, *Amorpha* (Légumineuses Galégées). — Petit arbrisseau produisant, en juillet et août, des épis violet foncé.

Tailler long et au printemps ; écimage d'été.

Ampélopside, *Ampelopsis* (Ampélidacées). — Lianes vigoureuses et décoratives par leurs corymbes floraux printaniers, provoquant des bouquets de baies noires ou azurées, et par leur feuillage qui devient citron et sanguin, à l'automne.

Toilette d'hiver lors du palissage et de la taille sommaire, après la chute des feuilles.

Andromède, *Andromeda* (Ericacées Andromédées). — Série d'arbustes verts, buissonneux, préférant la terre de bruyère et un peu d'ombre ; grappes de fleurs blanches, en petits grelots, fin hiver et commencement de printemps.

Ne réclamant aucune taille.

Aralia, *Aralia* (Araliacées). — Les espèces à feuilles caduques ou à feuilles persistantes ne subissent aucune taille et se ramifient, tout en fleurissant à leur époque, pendant la belle saison, fructifiant ensuite.

Arbousier, *Arbutus* (Ericacées Arbutées). — Arbrisseau toujours vert, fleurissant fin hiver en grappes blanches ou roses, supportant parfois la taille d'été, dans sa région, lorsque le branchage se dégarnit. Fruit rouge.

Argousier rhamnoïde, *Hippophae* (Elæagnacées). — Grand arbrisseau ou petit arbre à feuilles fines, argentées ; la fleur en avril, jaune verdâtre ; la corolle femelle se transformant en baie nankin vermillonné, adhérent à la branche jusqu'en hiver.

Taille inutile, sauf en haie vive.

Arbrisseau des dunes et des bords de la mer.

Aristolochie, *Aristolochia* (Aristolochiacées). — Liane à feuilles larges, propre à garnir les berceaux et murailles où elle laissera voir, en mai et juin, ses fleurs en pipe ou syphon, ponctuées chamois et brun à la lèvre.

Palissage et toilette des rameaux à la montée de la sève et à la chute des feuilles.

Armoise, *Artemisia* (Composées Anthémidées). — Arbuste nain, épanouissant, en août et septembre, ses petits capitules de grappes menues, jaunes, à l'extrémité des rameaux supérieurs.

Taille longue au printemps, si la plante se dégarnit.

Aubépine, *Cratægus* (Rosacées Pomées). — Arbres et arbrisseaux épineux, recherchés pour leur floraison

printanière, — fleur simple ou double, blanche, rose ou cramoisie, — et pour leur fructification à l'automne.

Aussitôt la fleur passée, une taille de propreté, raccourcissant les brins qui ont fleuri et arrêtant les longues branches, suffira.

Les variétés fructifiantes auront leur branchage éclairci au sécateur, en hiver, et la taille après défloraison se bornera à écimer les branches trop chargées.

Aucuba, *Aucuba* (Cornacées). — Arbuste ou petit arbrisseau à beau feuillage luisant, persistant, vert ou marbré, flammé, marginé blanc crémeux ou jaune paille.

La fleur pistillée ne brille guère; la fleur staminée, plus en vue, annonçant que terre et végétaux entrent en liesse, ne présente pas un titre suffisant à cette nomenclature des arbustes à fleurs, mais la fructification qui résulte de l'acte fécondant est si ornementale que nous ne pouvons l'oublier. (L'exception confirme la règle...)

Taille inutile et même nuisible.

Aulne, *Alnus* (Cupulifères Bétulées). — Arbre de 2^e et de 3^e grandeur, gardant longtemps son feuillage, et dont la fleur femelle se transforme en petit cône brun.

Terrain frais pour l'Aulne *glutineux*; calcaire pour les Aulnes à *feuille blanchâtre* et *en cœur*.

Aucune taille, élagage modéré.

Azalée, *Azalea* (Ericacées Rhodorées). — Arbrisseaux et arbustes de terre de bruyère, à mi-ombre, épanouissant leurs corolles fraîches ou brillantes, au sommet des rameaux, en première saison.

La plante se ramifie bien par la taille et le pincement d'été appliqués sagement.

Taille d'hiver inutile, même nuisible à la floraison.

Azalées d'Amérique, de Pont et A. de Chine, *Az. Mollis*.

Azédarach, *Melia* (Méliacées). — Petit arbre sous notre climat, produisant, dans la région sud, en plein été, des panicules florales lilacinées, odorantes, qui se présentent à l'aisselle de feuilles agréablement bi-pennées.

Taille modérée après l'hiver.

Baccharide, *Baccharis* (Composées Astéroïdées). — Grand arbuste à feuillage lent à tomber, couronné à l'automne par une inflorescence de petits capitules dioïques, portant une aigrette blanche, soyeuse, duveteuse, utilisée aux décors d'hiver.

Tailler les rameaux au printemps, lorsque les yeux apparaissent.

Bagnaudier, Colutea (Légumineuses Galégées). — Branchage quelque peu dégingandé ; fleur jaune tout l'été sur les jeunes pousses, suivie d'une fructification ornementale.... qui amuse les enfants.

Taille assez longue, avant la végétation.

Bambou, Bambusa (Graminées Bambusées). — Végétaux buissonnants, d'une grande élégance par leurs chaumes élancés et leur feuillage léger, persistant ; à isoler sur pelouse ou sur le bord des eaux. Refuge des oiseaux.

Édrageonner les rejets superflus.

Bibacier, Eriobotrya (Rosacées Pomées). — Arbrisseau à beau feuillage étoffé, persistant, donnant en octobre et au réveil de la sève, dans la région de Paris, des grappes tomenteuses, de fleurs blanc terne, parfumées.

En Provence, petit arbre à fruit jaune, comestible.

Taille inutile. Quand les touffes sont fortes et branchues, supprimer, à l'intérieur, les ramilles étiolées.

Bignone, Tecoma (Bignoniacées). — Arbrisseaux à branches volubiles ou ramassées. Floraison de juillet en septembre, en tubes vermillon orangé, crème ou marron. Quoique palissées, les espèces à tiges sarmenteuses, grimpantes, acceptent la taille des rameaux, une fois leur développement atteint.

Tailler après les gelées. Taille modérée, à la montée de la sève, des espèces buissonnantes.

Bouleau, Betula (Cupulifères Bétulées). — Arbre de moyenne grandeur, décoratif par son port léger, son feuillage frémissant, son écorce blanc de céruse. Floraison précoce ; à profiler dans les parcs et au lointain.

Variétés à port pyramidal ou pleureur, à feuillage lacinié, pourpre, glauque ou doré.

Taille inutile ; élagage rare ou nul.

Buddléia, Buddleia (Loganiacées). — Floraison estivale en épis ou en bouquets violet, lilas ou safran.

Taille printanière, une fois les gelées passées. Éviter les tailles longues et répétées sur la même plante.

Le *Buddleia variabilis*, à branchage étendu, aux grappes mellifères, sera taillé court, sur ramifications.

Buis, Buxus (Buxacées). — Arbrisseaux et arbustes à feuillage persistant, vert, doré, argenté, crémeux. Nombreuses espèces et variétés rustiques, différant par la taille de l'arbuste, son port pyramidal ou ramassé, la dimension des feuilles ou l'ampleur de la panachure.

Floraison hivernale, visitée par les abeilles.

En mars ou en septembre, tondre aux cisailles les rideaux de Buis en arbre (*B. sempervirens*), et les bordures de Buis nain (*B. suffraticosus*).

À grouper, isoler, disséminer ou dresser en rideau.

Dispersé sous bois, c'est un bon couvert pour le gibier.

Buisson-ardent, *Pyracantha* (Rosacées Pomées). — Arbrisseau toujours vert, à dresser ou à palisser, décoratif par ses corymbes de fleurs printanières, blanches, se transformant en fruits d'hiver, rouge orangé.

Taille inutile ou à peu près ; le palissage suffit.

Callistémon, *Callistemon* (Myrtacées Leptospermées). — Arbrisseau de la région sud, fournissant en juillet, des inflorescences dressées, par épis ramairés agrégés, l'ensemble ayant l'aspect d'un manchon rougeâtre ou d'une brosse à verre de lampe. Serre froide, à Paris.

Taille modérée, au printemps, en Provence, où l'arbuste vit à l'air libre.

Calycanthe, *Calycanthus* (Calycanthacées). — Arbuste buissonneux émettant en mai et juin sa fleur, en tête, grenat mat, odorante, au parfum dit « de reinette ».

Absence de taille ou écimage des rameaux, fin hiver.

Camellia, *Camellia* (Ternstrémiacées). — Petit arbre ou grand arbrisseau préférant la terre de bruyère. Floraison hivernale, admirable, aux coloris frais et variés.

Taille modérée, en avril-mai, lorsque l'arbre se dégarnit. Éviter la taille des branchages courts.

Arbre vivace à l'air libre, en région tempérée.

Caragana et **Calophaca** (Légumineuses Galégées). — Arbrisseaux et arbustes plus ou moins épineux et buissonnants. Petite fleur jaune, solitaire ou groupée, en première saison, sur les rameaux de l'année précédente.

La taille les fatigue et nuit à la floraison.

Écimage ou non-taille de l'**Halimodendron**, genre voisin, donnant en mai-juin des bouquets rose lilacé.

Caryoptéris, *Caryopteris* (Verbénacées). — Joli arbuste à l'arrière-saison, ses rameaux étant terminés par des grappes verticillées de fleurs bleu clair ou gris de lin, de qualité mellifère.

Butter le collet de la plante avant l'hiver, et tailler ses rameaux, court, au réveil de la sève. Arrosages rares.

Casse, *Cassia* (Légumineuses Cassiées). — Arbuste sous-frutescent ; d'août en octobre, bouquets terminaux ou axillaires de fleurs jaune éclatant. Climat tempéré.

Taille courte, avant la montée de la sève.

Céanothe, *Ceanothus* (Rhamnacées). — Groupe d'arbustes de premier plan, fleurissant en été par grappes ou capitules terminaux d'une gamme étendue, passant du blanc au rose carminé, du bleu porcelaine au gris de lin et à l'outre-mer ardoisé.

Taille printanière, après les froids.

Céphalanthe, *Cephalanthus* (Rubiacees Nacléées). — Arbuste ramifié, les jeunes rameaux rougeâtres ; la fleur petite, blanche groupée en capitule globuleux, se montre en juillet-août. Exposition ombragée, sol frais.

Taille à peu près inutile, sauf aux rameaux qui s'égaient.

Cerisier, *Cerasus* (Rosacées Prunées). — Les espèces à rameaux étalés ou retombants se contentent du palissage et de la toilette.

Les Cerisiers à fleur double, blanche ou rose, ne réclament aucune taille.

Le Cerisier *Mahaleb* « de Sainte-Lucie », non taillé, forme des buissons à petits bouquets blancs, à fruit noir.

Lièvres et lapins respectent son écorce.

Cesalpinia (Légumineuses Césalpiniées). — Arbuste épineux partout, jusque sous son feuillage élégant, émettant, en été, des épis dressés de fleurs jaune d'or.

Taille printanière, au sécateur.

Cestreau, *Cestrum*, et *Habrothamnus* (Solanacées Cestrinées). — Arbustes fleurissant de couleurs variées, fin de saison ; ornement des jardins, région Sud.

Tailler au printemps.

Chalef, *Elæagnus* (Eléagnacées). — Arbrisseaux, petits arbres et arbustes, les uns à feuilles caduques, les autres à feuillage persistant ou lent à tomber. Fleurs petites, blanc crèmeux ou ambre clair, odorantes.

L'*El. reflexa*, toujours vert, fleurit à l'automne ; il sera palissé et légèrement taillé.

Les espèces à feuilles caduques, fleurissant en mai et fructifiantes, seront taillées long, et même absence de taille si le branchage est court et régulier.

Réserve pour le gibier, en sous-bois.

Chamécérisier, *Chamæcerasus* (Caprifoliacées). — A l'exception des Chamécérisiers *odorant* et de *Standish*, fleurissant fin hiver et qui peuvent être taillés aussitôt après, les espèces qui développent leur inflorescence blanche, rose ou carminée, en mai, sur de jeunes pousses, vert frais, seront exemptées de la taille ; sinon tailler, fin hiver, assez long, puis court, après la fleur.

Au Chamécérissier *de Tartarie* et à ses variétés, fleurissant en avril, taille très longue ou absence de taille.

Charme, *Carpinus* (Cupulifères Corylées). — Petit arbre ou grand arbrisseau de forêt ou de parc utilisé en rideaux et charmillés. Variétés d'un port pyramidal ou de feuillage coloré. Feuilles et graines lentes à tomber.

Tonte des rideaux en février ou en septembre.

Chêne, *Quercus* (Cupulifères Quercinées). — Le roi de nos forêts. Variétés indigènes ou exotiques à feuillage coloré ou persistant, plus ou moins denté, d'un bel effet dans les grandes propriétés.

Floraison monoïque. Fruit varié de forme et de grosseur.

Aucune taille, mais un peu de toilette.

Chénomèle, *Chænomeles* dit « Cognassier du Japon » (Rosacées Pomées). — Floraison hivernale ou printanière, blanche, carnée, jaunâtre, rose, carmin, vermillon, rouge sang, etc., sur rameau ligneux. Fruit décoratif.

Taille après fleur. Dressage et toilette du branchage.

Chèvrefeuille, *Caprifolium* (Caprifoliacées). — Rameaux volubiles ; floraison précoce ou estivale, suivant l'espèce, parfumée, variant du blanc au lilas violacé ou au carmin vif, et du jaune pâle à l'orangé.

Ici, la taille d'hiver est une question de garniture, de dressage, de palissage et de toilette.

Les types toujours verts réclament encore moins la taille, surtout en été, ou simplement l'écimage des brins fluets, aussitôt l'hiver terminé.

Chimonanthe, *Chimonanthus* (Calycanthacées). — Arbuste buissonneux ; floraison blanc jaunâtre, odorante, avant la feuillaison.

Éviter la taille d'hiver ; tailler après la fleur, si la plante est mal faite, sinon éviter les mutilations.

Chionanthe, *Chionanthus* (Oléacées). — Grand arbrisseau ramifié qu'il importe de ne pas tailler.

Les boutons de tête sont florifères ; au début de la sève, ils émettent des panicules blanc pur ou nacré, et la végétation continue. Docile au forçage.

Choisya, *Choisya* (Rutacées Zanthoxylées). — Arbuste toujours vert ; floraison hiemale ou printanière, parfois remontante, en panicules corymbiformes, terminales, blanches et odorantes. Climat tempéré.

Absence de taille, surtout en hiver. Pincement long, en été. Arrosages modérés.

Ciste, *Cistus* (Cistacées). — Arbuste sous-frutescent, toujours vert, à grande fleur blanche, lilas ou violacée, en juin et juillet ; aimant le soleil du midi de la France.

Tailler au printemps, à mi-bois, ou pincer long.

Citronnier, *Citrus* (Rutacées Citrées). — Le *C. trifoliata*, *Ægle sepiaria*, est toujours vert, épineux, à fleur blanche, parfumée, tout l'été. Climat modéré.

Absence de taille, sauf en haie vive.

Clématite, *Clematis* (Renonculacées). — Espèces sarmenteuses, s'étoilant d'inflorescences aux nuances variées, commençant au blanc pur, crèmeux ou mauve, passant de l'azur au bleu lavande, à l'indigo et au violet évêque, atteignant même au cramoiis pourpré sur leurs sépales pétaloïdes ; et types à fleur en bourse, carminée.

Clematis montana, fleurit d'avril en juin ; tailler aussitôt après.

Cl. Flammula, à fleur blanche, odorante, en été ; taille d'hiver.

Les sections *Cl. patens* et *florida* fleurissent de mai à juillet, sur vieux bois ; taille longue au printemps, modérée en été.

Les sections *Cl. Viticella* et *Jackmanni* ouvrent leur calice-corolle de juillet en octobre ; tailler en hiver les tiges fortes, à 2 ou 3 yeux, et les faibles à un œil.

Toilette, dressage et palissage suivis.

La section *Cl. lanuginosa* s'épanouit en juin sur tige ancienne et continue sur pousses nouvelles, jusqu'aux gelées ; avant la sève, tailler à 6 ou 8 bons yeux les gros brins, et plus court les fluets.

Cléthra, *Clethra* (Ericacées Cléthrées). — Arbuste de climat tempéré ; floraison paniculée, dressée, terminale, en épis blanc de neige, au mois d'août.

Taille modérée, au printemps.

Corète, *Kerria* (Rosacées Spiréées). — Arbuste moyen, à fleur printanière, en pompon jaune de chrome ou orangé, et émettant au collet de nouvelles pousses qui peuvent fleurir à l'arrière-saison.

Il est rare que la taille soit nécessaire. Écimer en été.

Cornouiller, *Cornus* (Cornacées). — Grands arbustes ombelles terminales, blanc laiteux, au printemps et fin été. Taille d'hiver modérée. Pincement estival des longs bois ; ménager les ramifications.

Les variétés du *Cornus Mas* ne réclament aucune taille. Leur floraison jaune soufre se manifeste avant la fin de l'hiver, et leur drupe coloré termine la saison des fruits.

Coronille, *Coronilla* (Légumineuses Hédysarées). — Arbuste ramifié, de taille moyenne ; fleur jaune, par bouquets, d'avril en juin. Terrain sec ou en caisse.

Taille modérée à la défleuraizon ou écimage des longs rameaux, en hiver. La taille longue d'été peut provoquer une seconde floraison.

Corylopsis, *Corylopsis* (Hamamélidacées). — Arbuste assez rustique, aimant la terre de bruyère, fournissant fin février, avant l'arrivée des feuilles, — ressemblant à celles du Noisetier, — des grappes pendantes, jaunâtres, odorantes, souvent réunies par bouquets.

Taille inutile. Pincer, en été, les rameaux qui s'allongent trop.

Cotonéaster, *Cotoneaster* (Rosacées Pomées). — Arbuste à feuilles caduques ou persistantes, se couvrant au printemps de fleurettes blanches ou carnées, auxquelles succèdent de petits fruits rouges ou noirs.

Les rongeurs sembleraient vouloir mépriser son écorce.

Les espèces à feuilles tombantes et à grande végétation seront taillées pour la régularité du branchage, mais assez long, en hiver, ou simplement écimées en été.

Laisser intactes les espèces à feuilles persistantes.

Cytise, *Cytisus* (Légumineuses Génistées). — Arbrisseaux et arbustes à floraison printanière ; fleur jaune, blanche, lilas, chamois ou pourpre.

La section *Laburnum*, à gros bois, à grappes, redoute la taille qui fatigue ses tissus et réduit sa floraison. Écimage d'été, s'il y a lieu.

La section *Cytisus*, à bois fin, craint aussi la taille, sauf les types vigoureux (*C. trifolium*), qui seront raccourcis à la défleuraizon.

Daphné, *Daphne* (Thyméléacées). — Arbuste nain, aimant l'ombre ; fleur odorante, blanche, rose ou violacée, avant la fin de l'hiver, le long du rameau.

Taille inutile.

Absence de taille au *Daphné Lauréole*, toujours vert.

Desmodium, *Desmodium* (Légumineuses Hédysarées). — Arbuste sous-frutescent, fournissant, au collet, de longues pousses terminées à l'automne par une inflorescence en longue gerbe, violet pourpre.

Taille courte, en avril ; recape du *D. penduliflorum*.

Deutzia, *Deutzia* (Saxifragacées Hydrangées). — Arbuste buissonneux, à grappes printanières ; corolle simple ou double, blanche, rose ou lilas violacé.

Tailler à la défleuraison. En hiver, retrancher les branches diffuses ; écimer les jets fluets.

Les *Deutzias* nains sont rarement taillés ou pincés.

Dierville, *Diervilla* (Caprifoliacées). — L'espèce *canadienne*, au coloris jaunâtre, fleurit de juin en septembre et admet la taille d'hiver, à mi-bois.

L'espèce asiatique, *Dierville* rose, dit *Weigela*, fleurit de bonne heure, sur rameau ligneux, avec des coloris blanc, rose, carmin, jusqu'au pourpre et au grenat, et supporte la taille longue, fin juin, aussitôt la fleur finie.

Écimer les rameaux fluets, en hiver, et pendant la sève.

Épine-Vinette, *Berberis* (Berbéridacées). — Genre buissonneux, épineux, à feuillage caduque ou persistant ; fleurs en grappe, ou solitaires, ou naissant groupées à l'aisselle des feuilles ; jaune plus ou moins intense, au printemps. *Odor di semenza*. Fructification ornementale.

La taille des rameaux est inutile. Écimer les longues branches une fois défleuries. Eclaircir au sécateur les branchages compactes ; appliquer le même traitement aux espèces à feuillage persistant.

Érable, *Acer* (Sapindacées Acérées). — A part les grandes espèces (p. 30), les Érables *polymorphe*, *palmé*, et sous-variétés d'allure plus modeste, sont d'une richesse de feuillage coloré. Assez difficiles à la reprise, ils réclament de la terre de bruyère et un climat doux.

L'*Acer Ginnala*, arbuste buissonneux plus rustique, est décoratif, fin de l'été, par le ton chaud de son feuillage et les fins coloris de ses samares.

Févier, *Gleditschia* (Légumineuses Césalpiniées). — Arbre de 2^{me} grandeur, hérissé de dards ramifiés, agglomérés ; feuillage léger ; dès l'automne, gousses brun caroube. Variétés sans épines ou à rameaux étalés.

Taille nulle, sauf aux haies vives.

Fontanésie, *Fontanesia* (Oléacées). — Arbrisseau qui, jetant ses grands bras, porte un feuillage lent à tomber, et de petites fleurs en grappes, blanc terne, s'épanouissant dans le cours de l'été.

Palissage des rameaux et taille longue au printemps. Buttage du collet, à l'arrivée des froids secs ou humides.

Forsythie, *Forsythia* (Oléacées). — Grand arbuste s couvrant, dès la fin de l'hiver, d'innombrables clochette. citron et jaune vif. Robuste dans les sols calcaires.

Tailler long en avril-mai, aussitôt la fleur passée.

Palisser contre un mur, un treillage, un tronc d'arbre.

Frêne, *Fraxinus* (Oléacées). — Si le Frêne ne compte guère parmi les arbres à fleurs, combien il est décoratif par la diversité de ses formes : pyramidale, naine, en boule, pleureur ; la variété de son feuillage : gaufré, crispé, déchiqueté, unifié, doré, argenté ; jusqu'aux nuances de son écorce : citron jaspé rainette, sablé.

Fuchsia, *Fuchsia* (Onothéracées). — Arbrisseaux et arbustes décoratifs par leur floraison gracieuse, dans un massif du jardin, à l'ombre, ou dans une véranda, une serre froide.

Le Fuchsia s'est acclimaté en pleine terre sur nos plages normandes ou bretonnes, et sur le littoral de la Mer bleue.

Parcs, petits jardins, terrasses, corbeilles, savent profiter de la rusticité relative des *F. arborescens, coccinea, decussata, gracilis, procumbens, Riccartoni, Thompsoni*, en pleine terre mélangée de terreau de feuilles, sable et terre de bruyère. — Buttage du collet avant les gelées.

Fusain, *Econymus* (Célastracées). — Arbrisseau indigène, curieux à l'automne par ses capsules rose vineux et vermillon, tout au long des jeunes branches. Variétés à gros fruit, à feuillage fin, panaché ou pourpre.

Le Fusain du Japon et ses variétés à feuilles persistantes, vertes, marbrées ou panachées, à rameaux buissonnants ou sarmenteux, sont une précieuse ressource dans les compositions arbustives. Plantes isolées, ou de premier plan, de caisse ou de palissage.

Taille modérée en été ; toilette en tout temps.

Gainier, *Cercis* (Légumineuses Bauhiniées). — Arbre moyen, épanouissant, avant la feuillaison, de petits bouquets au coloris rose ou blanc carné, contrastant avec l'écorce noire qu'ils décorent.

Écimer, en été, les rameaux trop longs du branchage.

Gattillier, *Vitex* (Verbénacées). — Grand arbuste fournissant en septembre ses épis terminaux, bleu azuré, sur jeunes pousses. L'arbre des vierges.... autrefois !

Tailler au printemps, à mi-bois, après les froids.

Genêt, *Genista* (Légumineuses Génistées). — Arbustes de moyenne taille ou nains et rampants, à fleur jaune pur ou maculé, ou d'un coloris blanc pur.

Eviter la taille aux *Genista alba, arborea, Andreana, monosperma, præcox, repens, sagittalis*, et autres espèces ou variétés qui fleurissent au printemps.

Tailler en hiver, modérément, les espèces qui fleurissent en été : *Genêt d'Espagne, G. de l'Etna, G. de Sibérie*,

G. radié (Spartium), les *Genista candicans*, *tinctoria* et leurs variétés. — Plusieurs genres et sous-genres.

Glycine, Wistaria (Légumineuses Lotées). — Arbrisseau grimpant, développant en avril-mai ses grappes bleu mauve ou blanc de lait.

Taille inutile à la floraison. Au dressage d'été, ménager les brindilles florifères ; écimé et palisser les longs bois.

Grenadier, Punica (Punicacées). — Petit arbre des climats tempérés, réclamant l'espalier dans notre midi ; arbuste en caisse dans le nord, ornant les façades, les perrons, les vestibules, l'orangerie. A l'automne, fleur éclatante, rouge grenade ; quelques variétés au coloris pâle ou panaché, s'épanouissant sur le jeune rameau.

Taille complète au printemps. Toilette des branchages confus, et des tiges écailleuses.

Groseillier, Ribes (Ribésacées). — Arbuste rustique, buissonneux, épanouissant sa fleur en grappe axillaire, carmin, rose, aurore, jaune, blanc crèmeux, à corolle simple ou double, au premier printemps.

Il est rare qu'on ait besoin de le tailler au point de vue floral ; cependant les longs rameaux des Groseilliers *doré* et de *Gordon* pourraient être écimés en mai-juin.

Le Gr. des Alpes ne redoute pas la dent du lapin.

Halésie, Halesia (Styracacées). — Arbrisseau fleurissant blanc, en mai, par bouquets fasciculés ou subcorymbiformes de petites corolles campanulées.

Taille inutile ; écimé les longs rameaux, en été.

Hêtre, Fagus (Cupulifères Quercinées). — Arbre superbe et pittoresque par son port, ses dimensions extrêmes, la vivacité de son écorce ; pour avenues, groupes, grands massifs ou sujets isolés.

Variétés à rameaux retombants, à feuillage bronzé, pourpré ou tricolore, ou linéaire. Feuilles lentes à tomber.

Aucune taille, enlever le bois mort.

Hédysarum, Hedysarum (Légumineuses Hédysarées). — L'*H. multijugum* est un arbuste nain, au feuillage ailé et cendré ; floraison tout l'été, carmin violacé.

Plante de premier plan dans les massifs et corbeilles.

Taille courte au printemps ; petit tuteurage dérobé.

Houx, Ilex (Ilicacées). — Arbre, arbrisseau et arbuste à feuilles persistantes, épaisses, garnies ou privées d'aiguillons suivant l'âge ou l'espèce de la plante. Floraison printanière ; petites corolles agglomérées sur les

rameaux et se traduisant, à l'automne, en baies ponceau et vermillon, d'un séduisant effet.

L'espèce type convient encore au rôle de sous-bois.

Taille superflue.

Hydrangée, *Hydrangea* (Saxifragacées Hydrangées).

— Les espèces américaines fleurissent en plein été et peuvent être taillées, en hiver, sur leurs rameaux, lorsque l'âge adulte est arrivé.

L'*H. paniculata*, aux fortes grappes blanc de marbre, est taillé court, puis ébourgeonné avec soin.

Les espèces sous-frutescentes, plutôt asiatiques, *H. Hortensia*, *Otaksa*, *involucrata*, *japonica*, épanouissent rose ou blanc leurs corymbes en cymes, de juin en octobre. Tailler jusqu'au vif les rameaux ayant fleuri, et supprimer les petits rejets étiolés.

Indigotier, *Indigofera* (Légumineuses Galégées). —

Arbuste sous-frutescent, dont les jets se terminent par des gerbes de fleurs, rose lilacé, de juillet à septembre.

Receper la plante, après l'hiver.

Itéa, *Itea* (Saxifragacées Escalloniées). — Arbuste émettant, en juin, de petites grappes blanches, terminales.

Absence de taille ou taille longue.

Jasmin, *Jasminum* (Jasminacées). — Le Jasmin blanc, *J. officinale*, odorant, le *J. jaune*, *J. fruticans*, et leurs variétés, fleurissant en été, réclament une taille printanière, soit en mars-avril. Palisser le Jasmin blanc.

Le Jasmin *nudiflore* épanouit ses corolles axillaires, jaunes en hiver, rampe et ne réclame aucune taille, sauf écimage à la défleuraison et palissage dressé, s'il y a lieu.

Kalmia, *Kalmia* (Ericacées Rhodorées). — Arbrisseau vert, se couvrant de fleurs blanc rosé, au printemps, par corymbes frais et élégants ; exigeant la terre de bruyère, préférant le « mi-soleil ».

Aucune taille nécessaire à la floraison.

Kœlreutéria, *Kœlreuteria* (Sapindacées). — Petit arbre exaltant au mois de juin de grandes panicules jaune d'or, suivies de capsules vésiculaires à effet.

La taille n'aurait pas ici sa raison d'être.

Lagerstrémia, *Lagerstræmia* (Lythracées). — Grand arbrisseau de la région sud, à écorce douce au toucher, incarnat « cuisse de nymphe émue », donnant ses panicules rose pourpré, fin été et automne.

Tailler fin hiver.

Laurier-Amande, *Cerasus pseudo-Cerasus* (Rosacées Prunées). — Arbrisseau à beau feuillage lustré, persistant, produisant, au printemps, des épis de fleurettes blanches, se transformant en baies noires.

Plusieurs espèces et variétés indispensables au parc.

Taille inutile en faveur de la floraison. Ecimer le branchage des plantations en rideau, ou dirigées sous forme régulière ; le palissage serait préférable.

Même observation à l'égard du Laurier de Portugal, *Azarero*, prenant une forme plus pyramidale.

Leycesteria, *Leycesteria* (Caprifoliacées). — Arbuste sous-frutescent produisant, tout l'été, des fleurs blanc rosé et des fruits noir violacé, en épis retombants, sur tiges vert rainette.

Taille courte au printemps, et au besoin recepage des branches fatiguées ou âgées.

Lierre, *Hedera* (Araliacées). — Arbrisseau et arbuste à feuille persistante, de forme variée, de coloris vert foncé, doré ou argenté, propre à la garniture de murailles, rocailles, bordures, troncs d'arbre..., où il se cramponne. Fruits noirs en corymbe. Asile des pierrots ailés.

Palissage et toilette en toute saison.

L'arbuste greffé sur lui-même buissonne et fructifie.

Ligustrine, *Ligustrina* (Oléacées). — Grand arbrisseau ou petit arbre fournissant des panicules ramifiées, terminales, soyeuses, blanc d'ivoire, en juin-juillet.

Taille d'été modérée, une fois l'âge adulte venu.

Lilas, *Syringa* (Oléacées). — Arbrisseaux épanouissant au printemps de jolis thyrses blancs, carnés, roses, rouges, lilas ou purpurins et violacés, à corolle simple ou double, en tête des rameaux.

Éviter la taille d'hiver, sauf suppression des brins fluets. Une toilette du branchage suffit, aussitôt la fleur passée. Édrageonner les sujets greffés.

Les *Lilas de Perse* tenus en boule sont soumis à une tonte *bisannuelle* ou à la taille *combinée*.

Supprimer toutes les panicules aussitôt déflouries.

Les espèces *chinoises*, *japonaises* et *hongroises* ne réclament aucune taille d'hiver, mais une toilette d'été.

Lyciet, *Lycium* (Solanacées Atropées). — Grand arbuste à branches fines, retombantes, ouvrant en juin-juillet des corolles blanches ou lilacées, qui précèdent une fructification ornementale.

Tailler les rideaux ou haies au printemps. Laisser les plantes traîner à l'état naturel, sur talus ou en sous-bois

Magnolia, *Magnolia* (Magnoliacées). — Les espèces à feuilles caduques épanouissent leur corolle blanche, carnée, rose ou violette, à la montée de la sève et ne réclament aucune taille.

Les espèces à feuilles persistantes ouvrent leur corolle blanché et suave, de juin en novembre, et ne sont jamais taillées pour actionner la floraison.

Mahonia, *Mahonia* (Berbéridacées). — Arbuste toujours vert, émettant, au réveil de la sève, des faisceaux ou des bouquets de grappes de fleurs jaune vif, qui seront remplacées par des baies violet pruiné bleuâtre. Taille inutile. Couvert pour le gibier.

Merisier à grappes, *Padus* (Rosacées Prunées). — Grand arbrisseau fournissant, au printemps, des grappes de fleurettes blanches auxquelles succèdent des baies noires. Espèces rustiques de parc et de jardin.

Ni taille ni pincement.

Bon en sous-bois ; bon abri au gibier qui le respecte.

Millepertuis, *Hypericum* (Hypéricacées). — Sous-arbrisseau nain, donnant, de juin en septembre, des fleurs jaune brillant, surtout au plein soleil.

Tailler fin hiver. Taille plus sobre pour les espèces à feuilles persistantes, et nulle aux types gazonnants.

Mimosa, *Acacia-Mimosa* (Légumineuses Acaciées). — Petit arbre et grand arbrisseau de la région méditerranéenne, originaire de l'Australie, laissant échapper, en hiver, de son feuillage élégant, une pluie d'or par ses grappes et ses épis gracieux qui deviennent l'objet d'un commerce important avec les villes du Nord.

La floraison passée, et après deux mois de repos, tailler assez court et, s'il y a lieu, badigeonner l'écorce.

Morelle, *Solanum* (Solanacées). — Plante sarmenteuse, fleurissant en été des bouquets blancs ou lilas.

Taille d'hiver, surtout aux longs rameaux.

Moumé, *Prunus Mume* (Rosacées Prunées). — Petit arbre se couvrant, fin hiver, de corolles roses, blanches ou rouges, simples ou doubles, finement odorantes.

Tailler aussitôt défloraison, en avril, sur les branches de l'année précédente. Pincer en juin les longs rameaux.

Myrte, *Myrtus* (Myrtacées). — Arbrisseau de la région sud produisant, en juillet-août, de petites fleurs blanches sur les rameaux herbacés.

Tailler fin hiver, au réveil de la sève.

Nandina, *Nandina* (Berbéridacées). — Arbuste toujours vert, dont le feuillage se colore à l'automne ; de mai en octobre, bouquets dressés de petites fleurs blanches, se transformant en grappes de fruits rouges.

De régions centrales, il craint les vapeurs marines.

Taille inutile. Toilette après fructification.

Négondo, *Negundo* (Sapindacées Acérées). — La variété qui nous intéresse est le Négondo à *feuilles panachées de blanc d'argent* et même le N. à *feuilles dorées*. Les pyramides, tiges et buissons, sont d'un effet agréable. Les grappes de samares opalines en continuent l'ornementation, que l'on accentue par le contraste de voisins.

Taille à mi-bois pour alimenter le feuillage.

Une autre espèce plus élancée, le Négondo *de Californie*, donne au printemps des chatons rosés ; son écorce est douce au toucher...

Nérîum, *Nerium* (Apocynacées) dit « Laurier-rose ». — Arbrisseau vert de la région sud produisant, tout l'été, de jolis bouquets terminaux, roses ou blancs ou ambrés, à corolle simple ou double.

Tailler au printemps, avant la sève.

Néviusa, *Neviusa* (Rosacées Spirées). — Arbuste se couvrant, en avril-mai, de petites houpes florales, apétales, blanc crèmeux, par bouquets.

Tailler long, après défleuraison.

Noisetier, *Corylus* (Cupulifères Corylées). — Arbrisseau de massif ou de bordure dont les chatons (fleurs mâles) annoncent le réveil de la nature. Taille nulle.

Les variétés à *feuille pourpre* et à *feuille laciniée* ont un double titre : fruitier et ornemental.

Oléaria, *Olearia* (Composées Astéroïdées). — Arbuste toujours vert se couronnant, au printemps, de panicules ombelliformes, bien fournies, blanc terne.

Supprimer ces inflorescences, une fois flétries.

Orne, *Ornus* (Oléacées) dit « Frêne à fleurs ». — Petit arbre émettant, d'avril en juin, des bouquets de grappes soyeuses, nacrées, à reflets au soleil et au vent.

Taille inutile. Toilette sommaire.

Osmanthe, *Osmanthus* (Oléacées). — Arbrisseau à feuille persistante, coriace, lisse ou aiguillonnée sur les bords. Fin été et automne, apparition aux aisselles de petits bouquets de fleurs blanches, agglomérées, répandant un parfum utilisé par les Japonais à l'aromat du thé.

Taille inutile, sauf pour régulariser la forme du branchage ; alors un pincement d'été suffirait.

Passiflore, *Passiflora* (Passifloracées). — Arbustes et plantes volubiles, s'accrochant aux treillages exposés au soleil et à la chaleur, étoilant leurs guirlandes légères de « fleurs de la Passion », tout l'été et à l'automne. Un fruit comestible « grenadille » succède assez souvent à la fleur de la *P. bleue*. Buttage l'hiver, en pleine terre.

Tailler en hiver ou au printemps suivant la situation sous verre ou à l'espalier, dehors. Donner une direction sinueuse aux rameaux amaigris ou dénudés.

Pavia, *Pavia* (Sapindacées Æsculées). — Diverses catégories d'arbres et d'arbrisseaux à floraison printanière ou estivale, aux nuances blanches, jaunes et rougeâtres.

Le Pavia à épis, *P. macrostachya*, développe, en été, ses plumets ou épis blancs à longues étamines; la serpette doit le respecter.

Le Pavia de Californie, *Calothyrsus californica*, fleurit en été; on peut raccourcir, en hiver, ses longs rameaux.

Les autres espèces, citées plus loin aux grands arbres (II, page 30), ne seront pas taillées.

Pêcher, *Persica* (Rosacées Prunées). — Arbrisseau d'ornement assez délicat, à floraison printanière; corolle simple ou double, rose, blanche, rouge, striée.

Écimer, au printemps, les longs rameaux; tailler les brindilles à mi-bois, une fois défléuries.

Périplaque, *Periploca* (Asclépiadacées). — Liane de climat tempéré, se faisant remarquer, en été, par ses inflorescences sombres, odorantes.... à déplaisir.

Palisser, accrocher les rameaux sans les tailler. Buttage de la souche, en hiver.

Persicaire, *Polygonum* (Polygonacées). — Espèces ligneuses et sarmenteuses :

1° Le *P. multiflorum*, d'une grande vigueur, épanouissant ses grappes carnées fin de saison, sous un climat tardif au froid.

2° Le *P. baldshuanicum*, couvrant de juillet à octobre ses longues tiges volubiles de panicules nacrées, fleurs et graines ou fruits, d'un effet superbe.

Garnir d'abord, par le palissage, tout l'espace qui leur est destiné. Il n'y a aucun inconvénient à tailler ou écimer les rameaux trop longs ou disparates et à dégager ceux qui sont entrelacés trop intimement.

Phillyréa dit « Filaria ». — *Phillyrea* (Oléacées). — Grand arbrisseau; feuillage persistant, nu ou aiguillonné, petit, moyen ou large, suivant la variété.

En avril, épanouissement à l'aisselle des feuilles par petits fascicules et glomérules axillaires, de nombreuses corolles blanc de lait, odorantes, précédant une arrivée de baies bleuâtres.

Taille superflue. Pincement, s'il y a lieu, des rameaux qui nuisent à la régularité de la forme projetée.

Phlomide, *Phlomis* (Labiales). — Arbuste semi-ligneux, tomenteux et ferrugineux (*Ph. fruticosæ*) ; faux-verticille de fleurs jaunes, en juin et juillet.

Tailler modérément au printemps ; quand l'arbuste est bien touffu, on n'y touche pas.

Photinia, *Photinia* (Rosacées Pomées). — Grand arbrisseau ; feuillage persistant, vernissé ; larges corymbes floraux, blanc rosé, au commencement de l'été.

Taille inutile, sauf aux longs rameaux étiolés qui pourront être écimés en toute saison.

Pittospore, *Pittosporum* (Pittosporacées). — Arbrisseau ou arbuste toujours vert, se faisant remarquer au printemps par des bouquets de petites fleurs blanc de lait répandant une odeur suave.

Dans la région Sud où il est acclimaté, pincement des longs rameaux après la floraison.

Région de Paris, culture en caisse, au soleil, pendant l'été, et à l'orangerie, en hiver.

Pivoine en arbre, *Pæonia* (Renonculacées). — Arbuste nain, épanouissant de fastueuses corolles blanc pur, beurre frais, rose tendre, aurore, carmin, rouge violacé, pourpre noirâtre, etc., d'avril en juin.

Taille inutile, sinon étêter les longs rameaux après la floraison ; laisser intacts les rameaux non fleurissants.

Pommier, *Malus* (Rosacées Pomées). — Les espèces dites à fleur, *Malus spectabilis*, à corolle simple ou double, carnée ou rose vineux, seront écimées en hiver, taillées long en été, aussitôt la floraison terminée.

Les espèces ornementales par leurs fruits, même par leurs fleurs odorantes, *Malus baccata* et *cerasifera*, seront peu ou point taillées en hiver, une fois le branchage régulier établi. Aérer les branchages diffus.

Poincillade, *Poinciana* (Légumineuses Césalpiniées). — Le *P. Gilliesi*, arbrisseau ayant habituellement plusieurs jets à la base, constituant une belle touffe assez dégagée ; ces rameaux sont couronnés par une grappe de fleurs citron, au centre desquelles brille une aigrette de longues étamines purpurines, fin été et automne.

Pleine terre dans le midi, et au pied d'un mur, au soleil, région centrale : alors taille courte, et même recepage au printemps. Le buttage en hiver n'est pas un hors-d'œuvre.

Potentille, *Potentilla* (Rosacées Potentillées). — Arbuste nain se couvrant, tout l'été, de petits bouquets jaune pâle. Feuillage clair et tardif.

Faire la toilette au printemps, raccourcissant les longs brins et les brindilles étiolées.

Prunier, *Prunus* (Rosacées Prunées). — Ce groupe comprend plusieurs genres exotiques et notre *Prunellier* ; leur fleur simple ou double, rose ou blanche, orne les rameaux de l'arbuste au premier printemps.

Tailler long sur jeune bois, à la défleuraison ; écourter les longues ramifications, en été et en hiver.

Nous comprenons ici le Prunier *myrobolan* à floraison précoce, et sa variété *de Pissard*, feuillage pourpre, faisant valoir ses fraîches inflorescences, au renouveau.

Raphiolépis, *Raphiolepis* (Rosacées Pomées). — Arbrisseau toujours vert, émettant en mai-juin de petites grappes terminales, dressées, blanches à cœur rose.

Taille inutile. Toilette d'été.

Rhododendron, *Rhododendron* (Ericacées Rhodorées). — Arbrisseaux de terre de bruyère, se couvrant, en première saison, de magnifiques corymbes et épis floraux aux nuances brillantes, sombres ou tendres, richement variées. Superbes massifs à demi-ombre.

Taille superflue ; ici, la toilette d'hiver et d'été suffit.

Rhodotype, *Rhodotypos* (Rosacées Spirées). — Arbuste à fleurs printanières, blanches, au sommet de jeunes pousses, puis baies noires, persistant longtemps ; la touffe émet des bourgeons au collet.

Taille à peu près inutile ; écimage, en été, des jets stériles ou trop allongés.

Robinier, *Robinia* (Légumineuses Galégées). — Arbres et arbrisseaux épineux ou poilus, à grappes blanches ou roses, en mai-juin.

Inutile de tailler, sauf les branches dégarnies.

Le *Robinier visqueux*, couleur de chair, fleurit encore en juillet et août. Même traitement ou taille modérée.

Le *Robinier rose* fleurit au printemps, souvent fin été. Tailler en hiver, à mi-bois, pour éviter en même temps la rupture des branches exposées aux vents.

Le *Robinier du Nouveau-Mexique*, rose, fleurissant plus tard, réclame la taille d'hiver, modérée. (Voir suite, p. 31).

Romarin, *Rosmarinus* (Labiales). — Arbuste à feuillage fin, persistant, parfumé, vert glauque à revers blanc de céruse ; fleur lilas pâle, de février à mai.

Tailler en mai ou juin, après défleuraison.

Ronce, *Rubus* (Rosacées Rubées). — Arbuste à rameaux généralement épineux, trainants ou dressés.

Repaire des fauves en pleine forêt.

Les espèces à *fleur double*, blanche ou rose (de juin en septembre), seront taillées long en hiver, ou laissées intactes en talus, lisière, sous bois.

La Ronce odorante « Framboisier du Canada » de floraison estivale, rougeâtre, à rameaux érigés, suffrutescents, glanduleux, poilus, sera taillée court en hiver.

Rosier, *Rosa* (Rosacées Rosées). — Arbustes épineux, poilus ou glabres, recherchés pour leur floraison printanière ou remontante, dans la belle saison.

Les Rosiers indigènes ou exotiques épanouissant leurs corolles au printemps, dits « non remontants », seront taillés quand la floraison se terminera, plus court les rameaux fleurissants, plus long les autres. En été, pincer l'extrémité des longs brins pour augmenter les éléments floraux dans la ramification. Pratiquer la toilette d'hiver.

Les Rosiers « remontants », à floraison renouvelée, seront taillés à la montée de la sève, après les gelées. Taille combinée sur la même plante ; dégager les branches diffus ; supprimer les fleurs passées. Eviter les tailles d'été. Pincer les rameaux « gourmands » de certains Rosiers Thé, Noisette et autres à végétation vagabonde.

Tailler modérément les Rosiers grimpants. Le palissage de toute saison, utilisant les jets vigoureux, leur convient et peut suffire.

Saule Marsault, *Salix caprea* (Salicacées). — Nous voulons parler du type-mâle de cette espèce. Avant toute végétation, l'apparition des chatons soyeux illustrés d'étamines aux anthères jaune soufre annonce le réveil de la nature et attire les abeilles friandes de pollen après plusieurs mois d'abstinence.

Aussitôt la fleur disparue, tailler assez long de manière à provoquer la ramification qui, à son tour, émettra de nouveaux chatons l'année suivante. Cependant, taille court çà et là quelques rameaux et les pincer en juillet.

Seringat, *Philadelphus* (Saxifragacées Hydrangées). — Grands arbustes épanouissant, en juin, de petits bouquets de fleurs blanc de lait, crème, beurre frais c rose ; corolle simple ou double.

Fin hiver, tailler long les rameaux bien développés ; en juillet, tailler à mi-bois ceux qui ont fleuri ; ménager les autres ; supprimer les brins fluets, diffus.

Fin été, pincer les brins effilés des espèces vigoureuses, réservant les plus forts au rajeunissement de l'arbuste.

De nouvelles variétés, plutôt naines, seront soumises relativement au même traitement.

Skimmia, *Skimmia* (Rutacées Tòddaliées). — Arbuste toujours vert, nain, de région tempérée ; fleurs printanières, blanches, paniculées court ; petits fruits rouge corail, tout l'hiver.

Absence de taille. Buttage hivernal ou orangerie.

Spirée, *Spiræa* (Rosacées Spirées). — Nous divisons ce genre important en deux groupes basés sur l'époque de floraison.

1° Spirées à floraison printanière, ne devant pas être taillées en hiver ; réduire les rameaux lorsqu'ils sont déflouris, plus court les sujets vigoureux, à moins de pincement estival sur les brins « gourmands ».

Sp. à feuille de Germandrée ; petit corymbe blanc, en mai-juin.

Sp. à feuille lisse (*Sp. lævigata*) ; feuillage lent à tomber ; en mai, épi terminal composé de fleurs blanches.

Sp. à feuille ronde ; fleur grande, blanche, par corymbes en guirlande le long des rameaux ; commencement de juin.

Sp. à feuille de Millepertuis ; nombreux petits bouquets blancs, en avril, le long du rameau.

Taille d'été, à mi-longueur.

Sp. à feuille d'Obier ; vigoureux arbuste de 2° ou de 3° plan ; en mai, large corymbe, latéral, blanc rosé.

Ecimer ou pincer, en été, les longs rameaux.

Sp. à feuille d'Orme ; mai-juin, grappe sphérique, courte ; fleur blanche, hérissée d'étamines, s'épanouissant sur bourgeons développés. Tailler à mi-bois.

Sp. à feuille de Prunier ; multitude de fleurettes blanches, dès avril, tout le long de rameaux grêles. Pincement en été. Variété à fleur double. Bonne terre.

Sp. à feuille lancéolée ou de *Reeves* ; corymbe blanc, en mai-juin ; feuillage lent à tomber. Variétés :

Sp. lancéolée à fleur double ; fleurit après son type.

Sp. lancéolée robuste ; feuillage glauque ; fleurissant en mai-juin, également par bouquets axillaires.

Sp. à grande fleur, *Exochorda* ; épi blanc, floraison précoce, le long des rameaux. Taille longue, à la défleuraison. Eviter les terrains calcaires.

Sp. aimable (Sp. amoena) ; ombelle carmin lilacé, en mai et juin.

Sp. argenté ; en juin, guirlande de corymbes blancs.

Sp. arguta ; corymbes blancs, petits et nombreux.

Sp. cocciné ; corymbe rose, centre plus foncé ; juin.

Sp. conferta ; petits bouquets blancs, en mai.

Sp. de Hooker ; petits bouquets roses, en mai.

Sp. de Schinabeck ; corymbe glabre et axillaire de fleurs blanches, le long des rameaux ; mai.

Sp. de Thunberg ; à l'issue de l'hiver, large panicule corymbifère, blanc verdâtre ; taille à peu près nulle. Arbuste nain, réclamant une bonne terre.

Sp. de Van Houtte ; (précieuse sous-variété de la *Sp. à feuille d'Ancolie*) ; nombreux corymbes blancs, latéraux, au printemps.

Tailler à mi-bois les branches défléuries.

Sp. du fleuve Amour ; corymbe axillaire, hémisphérique, blanc rosé, en juin.

Sp. trilobée ; fin mai et juin, corymbe de fleurs blanches couvrant les rameaux.

2° Spirées à floraison estivale ou automnale (à tailler en hiver ; écourter les ramilles inutiles. Une taille combinée allongera quelques beaux brins ramifiables).

Sp. à épi serré (Sp. pachystachys) ; panicule compacte, rosé pâle à centre rouge ; juin-juillet.

Sp. à feuille d'Aria ; large panicule blanche, en été. Tailler long. Bon terrain un peu frais.

Sp. à feuille de Charme ; panicule terminale, glabre, de fleurs blanches à étamines rose carné ; fin juin et juillet.

Sp. à feuille de Saule ; de juin en août, épi terminal, ample, blanc carné ou rose ; craint les sols calcaires.

Sp. à feuille de Sorbier ; panicule thyrsoidale blanche, en tête ; d'avril en septembre. Tailler assez long.

Sp. blanche du roi ; panicule terminale, longue, pubescente, de fleurs blanches, centre carné ; en juillet.

Sp. conspicua ; feuillage lancéolé ; fleur rose, en été.

Sp. cotonneuse ; panicule rose, en août et septembre ; taille modérée.

Sp. de Bethléem ; panicule dense, à fleurs carnées, — en juillet. — Variété à fleurs roses.

Sp. de Billiard ; épi terminal paniculé, rouge vif ; de juin en septembre. Conserver les beaux rejets de souche. Cette espèce redoute les terrains crétacés.

Sp. de Californie ; longue panicule de fleurs rouge violacé, à étamines saillantes ; juillet et août.

Sp. de Douglas ; en tête, longue panicule serrée, rose vineux ; de juillet en septembre. Sol anticalcaire.

Sp. de Fontenay ; grappe paniculée terminale, blanc carné ; de juillet en septembre. Sous-variété à *fleur rose*. Tailler long, et pincer pour forcer la ramification.

Sp. de Fortune ; corymbes terminaux, rose carminé, se succédant pendant tout l'été. Sous-variétés :

Sp. de Fortune à fleur paniculée ; inflorescence subcorymbiforme ; rose foncé.

Sp. de Fortune rouge foncé ; corymbe carmin purpurin.

Sp. de Fortune naine blanche ; corymbe blanc de neige.

Sp. de Fortune superbe ; corymbe rose tendre.

Sp. de Fortune variété *Bumalda* et sous-variété *Anthony Waterer* ; arbustes nains, à corymbe rose ou rouge, en été. Écimage d'hiver.

Sp. de Fox ; arbuste nain ; larges corymbes terminaux, glabres, blancs ; juin et juillet.

Sp. de Lenné ; fleur rose, centre plus foncé, en panicule terminale, allongée, assez étroite ; juin-juillet.

Sp. de Lindley ; large thyrses terminal, blanc ; de juin en août. Tailler court, même receper.

Arbuste de deuxième et de troisième plan.

Sp. de Noble ; en été, panicule bien fournie, rose lilacé.

Sp. du Canada ; panicule blanche, en été. Variété rose.

Sp. du Népaül ; larges panicules de fleurs carnées à centre rose ; juillet.

Sp. en corymbe ; en juillet et août, corymbe terminal, blanc rosé. Tailler assez long.

Sp. expansa ; fleur carnée, en juin. Variété blanche.

Sp. Margarita ; large corymbe terminal, rose ; juillet.

Sp. pruinosa ; épis roses, en été. Taille modérée.

Sp. revirescens ; corymbe terminal, carmin clair ; été.

Staphyllier, *Staphylea* (Staphyléacées). — Grand arbuste donnant en avril-mai, sur les bourgeons développés, des grappes de fleurs, blanc nacré frais et coquet, surtout le ravissant *St. de Colchide* et sa variété *St. de Coulombier*, recherchés encore par la culture forcée.

Taille inutile ; elle serait funeste à la floraison. Soins de toilette, à la défleuraison.

Sorbier, *Sorbus* (Rosacées Pomées). — Le Sorbier nain donne, en mai, de larges corymbes blancs, suivis de fruits corail. — Ni taille ni pincement. (Voir aux grands arbres, p. 29).

Sumac, *Rhus* (Anacardiées). — Arbrisseau à grand développement, colorant son feuillage, fin été.

Le *Sumac Fustet* exhibe ses panaches paniculés, légers, vaporeux, en juin et juillet. Taille inutile ; toilette printanière. — Variété superbe, dite à *fleurs pourpres*.

Le *S. Osbeck* se couronne, fin été, de panicules florales blanc carné, et le *S. lacinié*, plus nain, par de gros épis verdâtre, émergeant d'un feuillage ailé, ornemental.

Le *S. de Virginie*, aux racines traçantes, colore de carmin son feuillage et d'amarante ses panicules de fruits.

Absence de taille quant à la floraison, ou taille d'hiver.

Sureau, *Sambucus* (Caprifoliacées). — Arbrisseaux et grands arbustes pour parcs, grandes clôtures, sous-bois.

Le *S. noir* et ses variétés ouvrent, au printemps, leur fleur blanche, en large corymbe terminal et latéral.

Eviter la taille ou réduire les branches ayant fleuri.

Le *Sureau à grappes*, blanc verdâtre, fruits rouges ; même opération.

Le *S. pubescent* et variétés, fleurissant plus tard ; grappes rose carné. Taille combinée.

Symphorine, *Symphoricarpos* (Caprifoliacées). — Arbuste de premier ou de second plan ; floraison d'été, carnée ou rose, suivie d'une fructification ornementale par bouquets et grappes de glumérules.

Tailler à mi-bois, en hiver ; éclaircir les branchages compacts ; édrageonner les rejets.

Tamarix, *Tamarix* (Tamaricacées). — Arbrisseau de floraison élégante et gracieuse, par groupes légers de petits épis rose ou lilas plus ou moins carminé.

Tailler assez long aussitôt défleuraison, le *T. de France* ou de *Narbonne* et le *T. d'Afrique* ou d'*Alger*.

Tailler à mi-bois, avant la sève, le *Tamarix de l'Inde* ou *élégant*, le *T. de Chine* ou du *Japon*, le *T. d'Allemagne*, le *T. hispida* (*kashgarica*), le *T. odessana*, qui fleurissent en été.

Troène, *Ligustrum* (Oléacées). — Petits arbres, arbrisseaux et arbustes à feuillage persistant ou demi-persistant, produisant de juin en août des panicules blanc de lait, puis des baies noir vif ou pruiné.

Ornement au jardin ; sous bois, abri du gibier.

Tailler long au printemps, les bourgeons de tête états plus florifères. Tonte des rideaux en mars et en septembre.

Viorne, *Viburnum* (Caprifoliacées). — Arbrisseaux, arbustes fleurissant au printemps ou en été ; corymbe terminal, blanc terne. On les taille peu ou modérément la défleuraison, sauf fructification ornementale.

Les *Viornes Obier* (sol frais), *Mancienne* (terrain sec) et variétés, et les *Viornes à grosse tête* et à *feuilles plissées*, fleurissent en mai-juin. Toilette après fleur.

Les espèces américaines ne sont guère taillées.

Le *Laurier-Tin* (*Viburnum Tinus*) à feuilles persistantes, se couvre de corymbes ombelliformes blancs ou carnés, à l'automne et en hiver. Tailler avec précaution, au printemps ; les principaux rameaux produiront alors des ramilles florifères.

Virgillier, *Cladrastis* (Légumineuses Sophorées). — Arbre moyen, rustique, à panicules blanchâtres, larges, longues et pendantes, en mai-juin.

Taille inutile à la floraison.

Xanthocéras, *Xanthoceras* (Sapindacées). — Arbuste émettant, au début de la sève, en tête, de jolies grappes, blanc mat à ongle aurore. Fruit original.

La plante, trapue, se ramifiant, la taille devient inutile.

Yucca, *Yucca* (Liliacées). — Plante décorative par son port pittoresque, son feuillage acaule et son inflorescence pyramidale, portant des clochettes blanches, en été, sans que la taille puisse l'y aider.

II. — GRANDS ARBRES A FLEURS

Nous groupons à part quelques espèces à grande envergure, développant librement leurs inflorescences sans le secours de la taille du branchage. Tels sont :

Ailante, *Ailantus* (Simarubacées). — Grand arbre, lent à bourgeonner, pour terrain sec. Au moment où ses fleurs pistillées passent à l'état de samarres, en juillet-août, elles revêtent des tons émeraude et ambre frotté de minium. Les grappes staminées répandent une odeur désagréable, ainsi que les jeunes feuilles.

Alisier, *Aria*, et **Sorbier**, *Sorbus* (Rosacées Pomées). — Arbres à tête ramifiée ; en mai, corymbes terminaux, blanc de coton, qui deviendront, à l'automne, des bouquets de fruits carmin orangé ou ponceau, bien connus des merles, grives et draines, surtout en temps de neige.

Catalpa, *Catalpa* (Bignoniacées). — Arbre à branchage étendu. En juillet-août, amples panicules de fleurs blanches à gorge ponctuée de pourpre, émergeant de larges feuilles vert clair.

Le *C. speciosa*, à floraison hâtive, dresse mieux sa ramure.

Dattier, *Phoenix* (Palmiers Phéniciées). — Bel arbre aux allures pittoresques, au stipe hardi, couronné de

palmes abritant de fortes panicules florales dioïques, jaune canari, se transformant, après la fécondation, en régime de dattes, sur les plants pistillés.

Arbre spécial à la région méditerranéenne, à l'Algérie, à la Tunisie.

Le vigoureux *Ph. canariensis* est préféré au jardin.

Aucune opération de taille.

Érable, Acer (Sapindacées Acérées). — Les Érables *Plane* et *Sycomore*, ont des inflorescences printanières, en corymbe dressé ou en grappe retombante, jaune verdâtre, ou pourpre avec les espèces à feuillage coloré; cependant l'Érable *rouge*, de Virginie, annonce le réveil de la nature par de petits bouquets de fleurettes sanguines, apparaissant avant la feuillaison de l'arbre.

Eucalyptus ou *Gommier* (Myrtacées Myrtées). — Géants, disons gigantesques australiens qui se plaisent sur la Côte d'Azur et en Algérie; feuilles persistantes, balsamiques, devenant phyllodes. Fleurs originales de forme, nuancées de blanc, de rose, de lilas, groupées en ombelles ou par capitules pluriflores, naissant sur des pédoncules axillaires. Plusieurs espèces intéressantes.

Marronnier, Aesculus (Sapindacées Aesculées). — Grand arbre à beau feuillage palmé d'où se dégage, en mai-juin, une profusion bien ordonnée de superbes thyrses dressés, au coloris blanc, à ongles plus ou moins rose.

La variété à *fleur double*, plus trapue, a l'avantage pour les promenades publiques de ne pas produire de fruits désagréables par leur coque épineuse.

Le Marronnier *rubicond*, moins grand, développe de belles panicules carminées sur un feuillage sombre.

Orme, Ulmus (Ulmacées). — Plusieurs espèces de 1^{re} ou de 2^e grandeur, à fleurette rouge, toute printanière, précédant des bouquets de samares transparentes. Le semis des graines peut être pratiqué de suite et fournir de bons plants à l'automne suivant.

Variétés à feuilles larges ou gaufrées, purpurines, argentées, dorées, marginées ou ponctuées.

Paulownia, Paulownia (Scrofulariacées). — Arbre de 2^{me} ou de 3^{me} grandeur, à large couronne branchée, ses panicules érigées, au coloris rare de bleu pervencé ou ardoisé, précèdent la frondaison de larges feuilles résistant à la poussière. Bois excessivement léger.

Pavia, Pavia (Sapindacées Aesculées). — Arbre moyen de bonne tenue; au mois de juin, épi floral dressé, rose rouge, carmin, ambré, illustrant un feuillage palmé.

Peuplier, *Populus* (Salicacées). — Beaux arbres par leur port, leur feuillage et précieux par leur utilisation. Feuillage tremblottant, vert lisse brillant ou bronzé, ou blanc de céruse au revers. Supprimer le gui, parasite.

On a pu réunir les types à fleur mâle, dont le chaton cotonneux n'est pas toujours agréable au voisinage.

Platane, *Platanus* (Platanacées). — Grands arbres pittoresques d'avenues et de promenades publiques. Le duvet de la face inférieure des feuilles est la terreur des ouvriers de pépinières.... trop bavards.

Ses grappes de petites houppes sphériques entrent dans le décor des intérieurs d'appartements ou galeries.

Robinier, *Robinia* (Légumineuses Galégées). — Arbre assez grand, lent à entrer en végétation ; rameaux cassants. En mai-juin, grappes pendantes et parfumées avec le *R. blanc*, type et ses dérivés : *R. monophylla*, *semperflorens*, *Decaisneana*, ce dernier ayant la grappe colorée rose de Bengale.

Le *R. glutinosa*, d'un coloris carné, plus clair, et non odorant, peut fleurir deux fois dans l'année.

Schinus Molle, *Mollé* ou *Faux Poivrier* (Anacardiacées), de la région niçoise et monégasque.

Arbre de taille moyenne, d'un feuillage léger, persistant, décoratif par ses panicules, de petits fruits corail et rubis succédant aux grappes de fleurs lactées.

Sophora, *Styphnolobium* (Légumineuses Sophorées). — Arbre de seconde grandeur ; larges panicules florales, blanc verdâtre, mellifères, illustrant un feuillage ailé.

Tilleul, *Tilia* (Tiliacées). — *T. de Hollande*, d'*Amérique*, *argenté*, soit un bel arbre. Ses petits corymbes de fleurs produisent un certain effet dans leur ensemble, et sont recherchés par les ménagères.... et par les abeilles.

Les *T. dasystyla* et *spectabilis* ont aussi les qualités d'arbres d'avenues, de rideaux ou berceaux, de promenades publiques ou privées.

Taille raisonnée et non radicale, chaque année.

Tulipier, *Liriodendron* (Magnoliacées). — Bel arbre dans un sol sablonneux, frais, au port élevé ; feuillage glabre, curieux dans sa découpure. Au commencement de l'été, épanouissement de corolles dressées en forme de tulipe, nuancées maïs, orange, émeraude et cinabre.

A tous ces arbres, une fois la couronne bien prise, les bons soins de toilette, d'hygiène et d'entretien suffiront.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

I. — ARBRISSEAUX ET ARBUSTES A FLEURS

A. — Arbustes à floraison estivale ou automnale.

(A tailler en hiver ou au printemps, « en sec ».)

Abélia (*Taille combinée*).
Actinidia.
Albizzia.
Althéa.
Amorpha.
Armoise.
Azédarach.
Baccharide.
Baguenaudier.
Bignone.
Buddléia.
Callistémon.
Caryoptéris.
Casse.
Céanothe.
Césalpinia.
Cestrum et Habrothamnus.
Chamécerisier (voir exception).
Chèvrefeuille.
Clématites : § flammula, vitt-
cella, Jackmanni, lanuginosa.
Cléthra.
Corète.
Cornouiller (*Taille combinée*).
Desmodium.
Dierville canadien.
Fontanésia.
Fuchsia.
Gattilier.
Genêt.
Grenadier.
Hedysarum.
Hydrangées américaines.
Hydrangée paniculée.

Indigotier.
Itéa.
Jasmins : blanc, jaune.
Lagerstrémia.
Leycestéria.
Lyciet.
Millepertuis.
Mimosa.
Morelle.
Myrte.
Négondo (pour son feuillage).
Nérum.
Passiflore.
Pavia de Californie.
Périploque.
Persicaire.
Phlomis.
Photinia.
Poincillade.
Pommiers buccifères.
Potentille.
Robiniers à fleur rose.
Ronce.
Rosiers remontants.
Seringat (*Taille combinée*).
Spirées (voir nomenclature
p. 26).
Sumac (sauf Sumac fustet).
Sureau pubescent.
Symphorine.
Tamarix : de l'Inde, de Chin-
d'Allemagne, hispida.
Troène (*Taille combinée*).
Viorne, « Laurier-tin ».

B. — Arbustes à floraison hivernale ou printanière.

(A tailler après la défleuraison, « en vert », taille d'été.)

Amandier.
Amélanchier.
Arbousier.
Aronia.
Aubépine.
Cerisier.
Chalef.
Chamécérasier odorant et de
Standish.
Chénomèle.
Chimonanthe.
Choisya.
Ciste.
Clématites : des Montagnes, pa-
tens, florida. (*T. combinée*).
Coronille.
Cytise (à bois fin).
Deutzia.
Dierville rose dit Weigela.
Érable.
Forsythia.
Gainier.

Glycine.
Groseillier.
Hydrangées asiatiques.
Jasmin nudiflore.
Laurier-amande; L. de Portugal.
Ligustrine.
Lilas.
Moumé.
Néviusa.
Oléaria.
Pêcher à fleurs.
Pivoine en arbre.
Pommier à fleurs.
Prunier à fleurs.
Rhodotype.
Romarin.
Rosiers non remontants.
Saulle Marsault.
Spirées (v. nomenclature, p. 25).
Sureaux : noir, à grappes.
Tamarix : de France, d'Afrique.
Viornes à feuilles caduques.

C. — Arbustes ne réclamant pas de taille, mais
de simples soins de toilette.

1^o à floraison hivernale ou printanière.

Akébia.
Alaterne.
Andromède.
Argousier rhamnolde.
Aucuba.
Aulne.
Azalée. ✕
Bambou.
Bibacier.
Bouleau.
Bourgène.
Buis.
Buisson-ardent.
Calophaça.
Camellia.
Caragana.
Chalef réfléxe.
Chamécérasier de Tartarie.
Charme.
Chêne.
Chionanthe.
Corylopsis.
Cotonéaster.
Cytise Aubours (à gros bois).

Daphné.
Epine-Vinette.
Frêne.
Fusain.
Halésie.
Halimodendron.
Hêtre.
Houx.
Kalmia.
Kœlreutéria.
Lierre.
Magnolia à feuille caduque.
Mahonia.
Merisier à grappes.
Noisetier.
Orne (Frêne à fleurs).
Phillyréa.
Raphiolépis.
Rhododendron.
Skimmia.
Sorbier nain.
Staphillier.
Viornes américaines.
Xanthocéras.

2° à floraison estivale.

Ajonc.
Ampélopside.
Aralia.
Aristolochie.
Calycanthe.
Céphalanthe.
Citronnier.
Magnolia toujours vert.

Millepertuis toujours vert.
Nandina.
Osmanthe.
Pavia (sauf P. de Californie).
Pittosporc.
Sumac Fustet.
Virgilier.
Yucca.

II. — GRANDS ARBRES A FLEURS NE RÉCLAMANT PAS LA TAILLE

Ailante.
Alisier.
Catalpa.
Dattier.
Erable.
Eucalyptus.
Févier.
Marronnier.
Négonde.
Orme.

Paulownia.
Pavia.
Peuplier.
Platane.
Robinier.
Schinus Mollé.
Sophora.
Sorbier.
Tilleul.
Tulipier.

Tels sont les principaux genres de l'arbusterie ornementale, acclimatés en France.

L'art du Paysagiste saura les distribuer au jardin, au parc, au square, d'après l'effet qu'ils ont à produire, isolés ou groupés.

A côté des essences à feuillage persistant ou annuel, les arbres résineux toujours verts jouent un rôle important, — surtout dans les grandes propriétés, — jalonnant les perspectives, découpant les horizons, et accentuant les fonds à toute époque de l'année.

Enfin, pour donner de la vie aux plantations nouvelles et charmer la vue, la Flore exotique dispersera ses trésors, — plantes à feuillage, plantes à fleurs, — quoiqu'éphémères, à travers les massifs d'arbustes ligneux autour des corbeilles ou épars sur les pelouses !



TABLE

La taille des arbustes en hiver ou pendant l'été	3
Taille longue, taille courte, taille combinée	4
Etude des principaux genres de l'arbusterie florale.....	4
I. — Petits arbres, arbrisseaux et arbustes à fleurs, classés par ordre alphabétique	4
II. — Grands arbres à fleurs	29
Résumé général.....	32
I. — Arbrisseaux et arbustes à fleurs	32
A. — Arbustes à floraison estivale ou automnale (à tailler en sec)	32
B. — Arbustes à floraison hivernale ou printanière (à tailler en été).....	33
C. — Arbustes ne réclamant pas de taille	33
1° A floraison hivernale ou printanière	33
2° A floraison estivale	34
II. — Grands arbres à fleurs ne réclamant pas la taille ..	34
Note additionnelle	34

GRAND PRIX — EXPOSITION UNIVERSELLE, 1878
Hors Concours, Membre du Jury, 1889 et 1900

Les plus hautes récompenses décernées aux Concours régionaux
après visites officielles aux Pépinières :

Grande Médaille d'Or du Ministère de l'Agriculture (1867),

Objet d'Art du Ministère de l'Agriculture (1875),

Prime d'honneur de l'Arboriculture (1892).

PRIX D'HONNEUR aux Expositions horticoles en France
et à l'Étranger.

ÉTABLISSEMENT D'HORTICULTURE
BALTET FRÈRES

A TROYES, FONDÉ EN 1820

CHARLES BALTET, Propriétaire et Directeur

ARBRES FRUITIERS

Jeunes sujets de pépinière et Arbres formés prêts à fructifier,
pour le jardin fruitier et le verger.

Collections complètes de fruits de table ou d'économie domestique
et industrielle, pour chaque usage et toute saison.

Choix sélectionné des meilleures variétés pour chaque époque.

Arbres fruitiers à cidre, à kirsch et à séchage ; variétés étu-
diées à la culture et au laboratoire d'analyses.

Vignes, raisins de table et cépages pour la cuve.

ROSIERS REMONTANTS

Collection des plus jolies roses, anciennes ou nouvelles ; sujets à
tige, à basse tige et francs de pied.

ARBRES D'ORNEMENT

Arbres pour avenues, routes, places et boulevards.

Arbrisseaux et Arbustes d'ornement et à fleurs pour le décor
des parcs, des squares et des jardins paysagers. Belles espèces.

Conifères et végétaux toujours verts, bien variés.

Plants forestiers pour boisement, clôtures, pépinières.

PLANTES DIVERSES pour Corbeilles et Parterres.

PLANTES VIVACES pour plates-bandes et bordures fleuries
de massifs d'arbustes.


Fraisiers, races remontantes et races à gros fruits. — Asperges.

Chrysanthèmes, remarquable collection.

Dahlias, Cactus, Bégonias, Fleurs variées, et

PERSICAIRE DE SAKHALIN (*Polygonum sachalinense*)
plante vivace fourragère, rustique et ornementale, à grand re-
ndement.

Les variétés d'arbres demandées par l'acheteur sont scrupuleuse-
ment fournies et l'étiquetage en est rigoureusement exact.



PRINCIPAUX OUVRAGES DE CHARLES BALTET

Traité de la Culture fruitière, commerciale et bourgeoise. Fruits de table, de pressoir, de séchage, de distillation, de pâtisserie, confiserie, etc., pour chaque saison. Recolte, emballage, entretien des vergers, fermes, routes et jardins fruitiers.. — Volume de 650 pages et 350 figures, 3^e édition, **6 fr.**

Médailles d'or de la Société nationale d'Horticulture de France et du Concours international de Bruxelles.

De l'action du froid sur les végétaux pendant l'hiver 1879-1880, ses effets dans les jardins, les pépinières, les parcs, les forêts et les vignes, avec la nomenclature des arbres et arbustes qui ont succombé ou résisté à la gelée. — Volume in-8°, 340 pages, **5 fr.**

Médailles d'or de la Société nationale d'Agriculture de France et de la Société Horticole, Vigneronne et Forestière de l'Aube.

Des Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air cultivés pour leurs fleurs ; 5^e édition. In-8°, **60 cent.**

Grande médaille d'argent au Congrès de 1898.

L'Horticulture dans les Cinq parties du monde. Ouvrage récompensé d'une *Médaille d'or* par le Congrès horticole de 1893, du *Prix Joubert de l'Hyberderie* (10.000 fr.) par la Société nationale d'Horticulture de France, de la *Médaille d'or à l'effigie d'Olivier de Serres* par la Société nationale d'Agriculture de France, et du *Prix Montyon* par l'Institut de France (Académie des Sciences). — Un volume grand in-8°, 778 pages, **15 fr.**

L'Horticulture française, ses progrès et ses conquêtes.

Grande médaille d'or de la Société nationale d'Acclimatation.

La Pépinière fruitière, forestière, arbustive, vigneronne et coloniale. Organisation et exploitation. Semis, bouture, greffe, multiplication et culture de 1.500 espèces et variétés d'arbres et d'arbustes d'utilité ou d'ornement. — Volume in-18 de 850 pages et 285 figures, **8 fr.**

Ouvrage récompensé de plusieurs médailles d'or.

L'Art de greffer les arbres, arbrisseaux et arbustes fruitiers, forestiers ou d'ornement, les cactées, les plantes de serre, les végétaux des colonies. — 8^e édition, 534 pages, 220 gravures, **4 fr.**

Médailles d'or de la Société des Agriculteurs de France, de la Société nationale d'Horticulture de France, etc.

La Greffe et la Taille des Rosiers, remontants, non remontants et grimpants ; soins de culture et d'hivernage : conseils aux débutants et aux amateurs. *Hommage aux Dames.* — Volume petit in-8° de 115 pages, avec 46 figures, **1 fr. 50.**

Les Routes fruitières : but, origine, installation, produit, choix des espèces à planter, **50 cent.**

Les Fruits de commerce, d'exportation et de marché. — Brochure de 52 pages et 11 figures, **75 cent.**

Chrysanthème et Dahlia. Histoire et choix des plus jolies variétés. — Brochure de 72 pages et 16 figures, **1 fr. 50.**

L'Histoire d'un pépin de pomme racontée par lui-même. Brochure in-8° de 56 pages, **1 fr.**

L'Horticulture florissante et féconde par l'initiative libre et l'action de l'Etat. — Brochure in-8° de 64 pages, **1 fr.**

Diverses Récompenses à ces derniers ouvrages.


ENVOI FRANCO







3 2044 103 114 799



0128